

Shockwavebehandeling bij vasculaire erectiele disfunctie

Low-intensity Focused Extracorporeal Shockwave Therapy (Li-fESWT)

Wat is een erectiele disfunctie?

Een erectie ontstaat doordat bloed in de zwellichamen van de penis stroomt. Bij een vasculaire erectiele disfunctie is de doorbloeding verminderd, waardoor een erectie onvoldoende stevig of onvoldoende langdurig kan zijn.

Wat is Li-fESWT?

Li-fESWT is een niet-operatieve behandeling waarbij laagenergetische, gefocusseerde schokgolven worden toegediend aan de penis. Deze stimuleren natuurlijke herstelprocessen in het vaatweefsel.

Voor wie is deze behandeling geschikt?

- Vaatgebonden erectiele disfunctie
- Milde tot matige erectiele disfunctie
- Onvoldoende effect van leefstijlmaatregelen of PDE5-remmers
- Diabetes, hypertensie of andere risicofactoren voor vaatlijden

Verloop van de behandeling

Een behandeltraject bestaat meestal uit zes sessies. De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. Verdoving is niet nodig en u kunt uw dagelijkse activiteiten direct hervatten.

Resultaten

Het effect ontstaat meestal geleidelijk in de weken tot maanden na de behandeling. Niet iedere patiënt reageert op de behandeling.

Veiligheid

Li-fESWT wordt over het algemeen goed verdragen. In de tot nu toe gepubliceerde klinische studies naar erectiele disfunctie zijn geen ernstige behandelingsgerelateerde complicaties gerapporteerd.

Belangrijk. Deze behandeling is bedoeld voor zorgvuldig geselecteerde patiënten. Tijdens het intakegesprek wordt beoordeeld of de behandeling voor u geschikt is.